

TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE ÁREAS EN EL HOSPITAL

CÓMO DEBO TRANSPORTAR EN UN CARRO COMUN UNA PERSONA CON SOSPECHA DE COVID-19?

Todas las personas con sospecha de COVID-19 deben ser aisladas precozmente, por lo tanto, se debe utilizar tapabocas quirúrgico durante todo el transporte o distanciamiento de 2 metros entre las personas.



Algunas medidas adicionales son necesarias:



- Evitar transportes que no sean necesarios

- Mejorar la ventilación de los vehículos para aumentar el cambio de aire durante el transporte



- Realizar frecuentemente la higiene de las manos con agua y jabón o una solución alcohólica de los pacientes, sus familiares y acompañantes

- Comunicar inmediatamente a los profesionales de los servicios ambulatorios y urgencias si el caso es sospecha o confirmado



- Limpiar y desinfectar todas las superficies internas del vehículo posterior a la realización del transporte. La desinfección puede ser hecha con alcohol al 70%, hipoclorito de sodio u otro desinfectante indicado para este fin

CUÁLES CUIDADOS DEBO TOMAR PARA PROGRAMAR EL TRANSPORTE DENTRO DEL SERVICIO DE SALUD?

ATENCIÓN!

- Limitar el transporte a lo estrictamente necesario
- Notificar al sector que irá recibir al paciente y también el servicio de transporte interno que el paciente está en precaución
- Durante el transporte el paciente debe utilizar el tapabocas quirúrgico
- **TODOS** los profesionales que participan del transporte del paciente deben utilizar tapabocas quirúrgico, gafas de protección, bata descartable y guantes de procedimiento.
- Use rutas de transporte predeterminadas para minimizar la exposición para los funcionarios, otros pacientes y visitantes




La **RECOMENDACIÓN** sobre el uso de bata desechable y guantes de procedimiento por el profesional de salud durante el transporte de pacientes es **EXCLUSIVA** para casos sospechosos o confirmados de infección por el **NUEVO CORONAVIRUS**.

Separe a un **SOLO** profesional para tocar superficies como manijas, puertas, barandas, elevador, etc., durante el transporte. Esta medida tiene como objetivo evitar la contaminación del medio ambiente y las superficies.

saude.gov.br





QUÉ CUIDADOS SE DEBEN TOMAR EN EL SERVICIO DE URGENCIAS MÓVIL PRE HOSPITALAR Y EL TRANSPORTE INTER-INSTITUCIONAL DE CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE COVID-19?



Si es necesario el transporte de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 de un servicio de salud para otro, éste deberá ser realizado en ambulancia, de acuerdo con las normas de bioseguridad.



Todas las personas con sospecha de COVID-19 deben ser aisladas precozmente, por lo tanto, se debe usar tapabocas quirúrgico durante todo el transporte hasta la llegada al local de destino.

Algunas medidas adicionales son necesarias:

- Evitar transportes desnecesarios
- Mejorar la ventilación de los vehículos para aumentar el intercambio de aire durante el transporte
- Realizar frecuentemente higiene de manos con agua y jabón o una solución alcohólica
- Todos los profesionales involucrados en el transporte deben usar tapabocas quirúrgico (inclusive el conductor).
- Los profesionales de salud deben estar con bata impermeable, guantes de procedimiento y tapabocas quirúrgico y en el caso de que necesiten realizar un procedimiento que genere partículas en aerosol deberán usar tapabocas de alta eficiencia N95 o PFF2.
- Se debe evitar la manipulación desnecesaria para minimizar la posibilidad de contaminación del equipo/material
- Comunicar inmediatamente a los profesionales del local que recibirán al paciente
- Limpiar y desinfectar todas las superficies internas del vehículo posterior a la realización del transporte. La desinfección puede ser hecha con alcohol al 70%, hipoclorito de sodio u otro desinfectante indicado para este fin.



saude.gov.br

